



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Причины, которые могут привести к раку кишечника

Рак кишечника (колоректальный рак, рак толстой кишки) – понятие, объединяющее злокачественные опухоли различных отделов толстой кишки.

Длительное время рак может протекать бессимптомно и проявить себя лишь на поздних стадиях. Если вовремя не выявить заболевание, опухоль может заполнить просвет кишки и вызвать кишечную непроходимость. Новообразование может прорасти в стенку кишечника, внедриться в окружающие органы. Возможно появление метастазов (отдаленных опухолей) в лимфатических узлах и других органах (в печени, легких и др.).

Точные причины колоректального рака не известны. Однако, зная определенные факторы риска, можно снизить вероятность развития данного заболевания.

Хотя колоректальный рак может возникнуть в любом возрасте, более чем у 90% пациентов рак диагностируют после 40 лет. Каждые 10 лет риск развития заболевания удваивается.

Тревожные симптомы

- частые запоры или диарея;
- вздутие живота, ощущение переполненности кишечника;
- боли, колики, ложные позывы к дефекации;
- кровь, слизь в кале;
- потеря веса без видимых причин;
- постоянная усталость, слабость;
- потеря аппетита.

Что нам под силу?

Изменить рацион. Избыточное употребление животных жиров, белков и рафинированных углеводов (сахара), а также недостаточное употребление продуктов, содержащих растительную клетчатку (фруктов, овощей) приводят к развитию заболеваний кишечника.

Больше двигаться. Малоподвижный образ жизни, избыточный вес также являются факторами риска возникновения рака.

Отказаться от курения. Вероятность «заработать» колоректальный рак у курильщиков на 30-40% выше, чем у некурящих.

Узнать, есть ли наследственная предрасположенность. Люди, чьи близкие родственники болели колоректальным раком, особенно если это было в молодом возрасте, относятся к группе риска.

Удалять полипы толстой кишки. Полипы – доброкачественные образования, которые имеют склонность к перерождению в злокачественные.

Лечить воспалительные заболеваний толстой кишки (язвенный колит, болезнь Крона). Обязательно наблюдение у специалиста, соблюдение всех врачебных рекомендаций, проведение колоноскопии с биопсией 1 раз в год.

Очень важно проходить профилактическое обследование у гастроэнтеролога, которое включает исследование кала на скрытую кровь. После 40 лет профилактические осмотры необходимо проходить каждые три года, а сдавать анализ кала на скрытую кровь раз в год.

**Помните, лечение рака на ранних стадиях –
это залог сохранения вашей жизни!**